

Procedury zabiegowe z wykorzystaniem aktywnych preparatów estGen

Przed przystąpieniem do wykonania procedur zabiegowych, należy przeprowadzić wywiad, wykluczając przeciwwskazania, oraz wypełnić kartę klienta. **Jedynie osoby z uprawnieniami** – w pełni świadome aspektów zabiegów kosmetologicznych oraz ryzyka powikłań w przypadku nieprzestrzegania zasad higieny oraz zaleceń podczas zabiegu i przeszkolone z posługiwania się aparaturą kosmetyczną – **mogą wykonywać poniższe procedury.**

Osoba wykonująca zabieg bierze pełną odpowiedzialność za wykonaną procedurę. Gwarantujemy skuteczność preparatów estGen stosowanych wyłącznie według procedur, z uwzględnieniem faktu, że indywidualne zachowanie skóry, na którą wpływają różne czynniki, jak stres, dieta, przyjmowane leki, mogą zaburzyć bądź wydłużyć cały proces terapeutyczny.

Programy zabiegowe estGen tworzone są w taki sposób, aby umożliwić także samodzielne łączenie ze sobą produktów i w żaden sposób nie ograniczają opracowywania własnych programów zabiegowych.

Osoba wykonująca zabieg, bezwzględnie informując klienta o zaleceniach pielęgnacyjnych i spisując je z nim, powinna zwrócić w szczególności uwagę na następujące kwestie:

- przez 7 dni po zabiegu klient nie może stosować na własną rękę żadnych kremów, maści i preparatów, a używać wyłącznie tych, które zaleciła osoba wykonująca zabieg
- przestrzegamy przed stosowaniem po zabiegu preparatów kortykosteroidowych, np. Hydrokortyzonu
- do 72 godzin po zabiegu należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny, a w szczególności – odseparować miejsca pozabiegowe od zwierząt i ich sierści oraz nieczystej pościeli i ubrań, które mogą przywierać do miejsca poddanego zabiegowi
- należy powstrzymać się od strzyżenia i farbowania włosów
- klient jest zobowiązany zgłosić osobie wykonującej zabieg każdy niepokojący sygnał
- przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu są ogólnoprijęte przeciwwskazania do zabiegów fizykalnych i zabiegu mezoterapii mikroigłowej

Zalecenia pozabiegowe dla klienta po wykonaniu zabiegów mikroigłowych:

- przez minimum 3 tygodnie lub do całkowitego wygojenia się skóry, unikać kąpieli słonecznych
- do zakończenia procesu gojenia, stosować ochronę przeciwsłoneczną
- przez minimum 7 dni unikać ujemnych temperatur (w tym krioterapii)
- przez minimum 7 dni obowiązuje całkowity zakaz korzystania z sauny oraz basenu
- przez minimum 7 dni obowiązuje całkowity zakaz stosowania zabiegów podrażniających skórę (np. peelingi, depilacje itp.)
- przez pierwsze 24 godziny nie zaleca się wykonywania makijażu na obszarze zabiegu

Skóra po zabiegu:

- możliwe łuszczenie się naskórka
- możliwe drobne wypryski wskazujące na samooczyszczanie skóry
- lekkie pieczenie i opuchnięcie
- objawy pozabiegowe zależą od indywidualnych preferencji skóry i mogą utrzymywać się od 2 do 14 dni

TRĄDZIK POSPOLITY

----- POCZĄTEK TERAPII -----

Skóra z zaburzoną barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy maskę w płacie **Płynem tonizującym (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 5-10 minut
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- obszar zabiegowy przykrywamy folią w celu okluzji lub pracujemy na nim aparaturą 10-20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywny regenerator kosmetyczny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat probiotyczny, Aktywny koncentrat peptydowy, Aktywny regenerator kosmetyczny, Żywa maska, Tarcza ochronna

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- nasączamy maskę w płacie **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10 minut
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę

- obszar zabiegowy przykrywamy folią w celu okluzji lub pracujemy na nim aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Krem aktywny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Płyn aktywny PLUS, Aktywne enzymy, Aktywny koncentrat probiotyczny, Krem aktywny, Żywa maska, Tarcza ochronna

----- DALSZY ETAPY TERAPII -----

Skóra z zaburzoną barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносим **Aktywne enzymy (2 dozy)** jako maskę, a dodatkowo w celu okluzji przykrywamy obszar zabiegowy maską w płacie nasączoną **Płynem tonizującym (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10–20 minut; po upływie tego czasu zwilżamy obszar zabiegowy, następnie zmywamy chustką kosmetyczną
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносим **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- obszar zabiegowy przykrywamy folią w celu okluzji lub pracujemy na nim aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na skórę наносим **Aktywny koncentrat probiotyczny (2 dozy)** jako maskę i pozostawiamy do wchłonięcia na 10–15 minut
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywny regenerator kosmetyczny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat probiotyczny, Krem aktywny, Żywa maska, Tarcza ochronna

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na obszar zabiegowy наносimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7-15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustą zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- obszar zabiegowy przykrywamy folią w celu okluzji lub pracujemy na nim aparaturą 10-20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносimy **Aktywną pastę (2 dozy)** jako maskę i pozostawiamy do wchłonięcia na 10-20 minut, następnie skórę zmywamy wodą
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Krem aktywny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Płyn aktywny PLUS, Aktywne enzymy, Aktywny koncentrat probiotyczny, Żywa maska, Aktywna pasta, Krem aktywny, Tarcza ochronna

TRĄDZIK RÓŻOWATY

----- POCZĄTEK TERAPII -----

Skóra z zaburzoną barierą hydrolipidową, łuszcząca się, z nadwrażliwością

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy maskę w płacie **Płynem tonizującym (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 5-10 minut

- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- **Aktywny koncentrat peptydowy (1 doza)** mieszamy z **Żywą maską (1 doza)** i jako maskę aplikujemy na skórę do wchłonięcia na 5–10 minut
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat probiotyczny, Aktywny koncentrat peptydowy, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Tarcza ochronna

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- **Aktywny koncentrat peptydowy (1 doza)** mieszamy z **Żywą maską (1 doza)** i jako maskę aplikujemy na skórę do wchłonięcia na 5–10 minut
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Płyn aktywny PLUS, Aktywny koncentrat probiotyczny, Aktywny koncentrat peptydowy, Żywa maska, Krem aktywny, Aktywny regenerator kosmetyczny, Tarcza ochronna

Skóra z przerostem nuceńca

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia

- nasączamy maskę w płacie **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10 minut
- nasączamy wacik **Płynem DEX STOP (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносimy **Aktywną pastę (2 dozy)** jako maskę i pozostawiamy do wchłonięcia na 10–20 minut, następnie skórę zmywamy wodą
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn DEX STOP, Aktywny koncentrat peptydowy, Aktywny koncentrat probiotyczny, Żywa maska, Tarcza ochronna, Aktywny regenerator kosmetyczny, Krem aktywny

----- DALSZE ETAPY TERAPII -----

Skóra z zaburzoną barierą hydrolipidową, sucha, odwodniona

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносimy **Aktywne enzymy (2 dozy)** jako maskę, a dodatkowo w celu okluzji przykrywamy obszar zabiegowy maską w płacie nasączoną **Płynem tonizującym (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10–20 minut
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia

- **Aktywny koncentrat probiotyczny (1 doza)** mieszamy z **Aktywnym koncentratem peptydowym (1 doza)** i jako maskę aplikujemy na skórę do wchłonięcia na 5–10 minut
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywny regenerator kosmetyczny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat probiotyczny, Aktywny koncentrat peptydowy, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Tarcza ochronna

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na obszar zabiegowy наносimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7–15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustką zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносimy **Aktywną pastę (2 dozy)** jako maskę i pozostawiamy do wchłonięcia na 10–20 minut, następnie skórę zmywamy wodą
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywny koncentrat probiotyczny (2 dozy)**, pozostawiamy do wchłonięcia, **Krem aktywny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Płyn aktywny PLUS, Aktywny koncentrat probiotyczny, Aktywny koncentrat peptydowy, Żywa maska, Krem aktywny, Aktywny regenerator kosmetyczny, Tarcza ochronna

Skóra z przerostem nuceńca, tłusta, gruba, oporna

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**

- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na obszar zabiegowy наносimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7–15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustką zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem DEX STOP (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносimy **Aktywną pastę (2 dozy)** jako maskę i pozostawiamy do wchłonięcia na 10–20 minut, następnie skórę zmywamy wodą
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Płyn aktywny PLUS, Płyn DEX STOP, Aktywny koncentrat probiotyczny, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Krem aktywny, Aktywna pasta, Tarcza ochronna

Skóra z przerostem nuceńca, sucha, wrażliwa

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносimy **Aktywne enzymy (2 dozy)** jako maskę, a dodatkowo w celu okluzji przykrywamy obszar zabiegowy maską w płacie nasączoną **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10–20 minut
- nasączamy wacik **Płynem DEX STOP (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia

- **Aktywny koncentrat probiotyczny (1 doza)** mieszamy z **Aktywnym koncentratem peptydowym (1 doza)** i jako maskę aplikujemy na skórę do wchłonięcia na 5-10 minut
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn DEX STOP, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat peptydowy, Aktywny koncentrat probiotyczny, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Aktywna pasta, Tarcza ochronna

TRĄDZIK OSÓB DOROSŁYCH (ACNE TARDA)

----- POCZĄTEK TERAPII -----

Skóra z zaburzoną barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy maskę w płacie **Płynem tonizującym (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 5-10 minut
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносимy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10-20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywny koncentrat probiotyczny (2 dozy)**, pozostawiamy do wchłonięcia, **Krem aktywny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat probiotyczny, Żywa maska, Koncentrat melano STOP, Tarcza ochronna

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносимy **Aktywne enzymy (2 dozy)** jako maskę, a dodatkowo w celu okluzji przykrywamy obszar zabiegowy maską w płacie nasączoną **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10-20 minut

- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносimy **Aktywną pastę (2 dozy)** jako maskę i pozostawiamy do wchłonięcia na 10–20 minut, następnie skórę zmywamy wodą
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Koncentrat melano STOP (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, **Krem aktywny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat probiotyczny, Żywa maska, Krem aktywny, Koncentrat melano STOP, Tarcza ochronna

----- DALSZE ETAPY TERAPII -----

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie bezpośrednio na skórę aplikujemy **Płyn melano STOP (1 doza)** i wykonujemy masaż dłońmi, wmasowując preparat w skórę
- na obszar zabiegowy наносimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7–15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustą zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia

- na skórę наносimy **Aktywny koncentrat probiotyczny (2 dozy)** jako maskę i pozostawiamy do wchłonięcia na 10–15 minut
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Koncentrat melano STOP (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, **Krem aktywny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat probiotyczny, Żywa maska, Aktywna pasta, Krem aktywny, Koncentrat melano STOP, Tarcza ochronna

SKÓRA WRAŻLIWA, NACZYNIOWA, AZS, EGZEMA, ATOPIA, ŁUSZCZYCA, WSPARCIE TERAPII ONKOLOGICZNYCH

----- POCZĄTEK TERAPII -----

Skóra z zaburzoną barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy maskę w płacie **Płynem tonizującym (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 5–10 minut
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- obszar zabiegowy przykrywamy folią w celu okluzji lub pracujemy na nim aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- **Aktywny koncentrat peptydowy (1 doza)** mieszamy z **Aktywnym koncentratem probiotycznym (1 doza)** i jako maskę aplikujemy na skórę do wchłonięcia na 5–10 minut
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywny regenerator kosmetyczny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat peptydowy, Aktywny koncentrat probiotyczny, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Tarcza ochronna

----- DALSZE ETAPY TERAPII -----

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносимы **Aktywne enzymy (2 dozy)** jako maskę, a dodatkowo w celu okluzji przykrywamy obszar zabiegowy maską w płacie nasączoną **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10–20 minut
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносимы **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- obszar zabiegowy przykrywamy folią w celu okluzji lub pracujemy na nim aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- **Aktywny koncentrat peptydowy (1 doza)** mieszamy z **Aktywnym koncentratem probiotycznym (1 doza)** i jako maskę aplikujemy na skórę do wchłonięcia na 5–10 minut
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywny regenerator kosmetyczny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Aktywny koncentrat peptydowy, Aktywny koncentrat probiotyczny, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Tarcza ochronna

ANTI-AGING, ODBUDOWA, ZAGĘSZCZANIE SKÓRY

----- POCZĄTEK TERAPII -----

Skóra sucha, wrażliwa, teleangiektazje

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy maskę w płacie **Płynem tonizującym (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 5–10 minut
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносимы **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)

- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywny regenerator kosmetyczny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Aktywator młodości, Aktywny koncentrat peptydowy, Aktywny płat kosmetyczny, Tarcza ochronna

Skóra gruba, oporna, tłusta, niedotleniona

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie bezpośrednio na skórę aplikujemy **Płyn melano STOP (1 doza)** i wykonujemy masaż dłońmi, wmasowując preparat w skórę
- na obszar zabiegowy наносimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7-15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustką zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10-20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywator młodości (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Aktywator młodości, Aktywny płat kosmetyczny, Tarcza ochronna

----- DALSZE ETAPY TERAPII -----

Skóra z możliwością wykonania mikronakłuć (etap 1)

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia

- nanosimy **Aktywne enzymy (2 dozy)** jako maskę, a dodatkowo w celu okluzji przykrywamy obszar zabiegowy maską w płacie nasączoną **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10-20 minut
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- wykonujemy mikronakłucie
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty nanosimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- **Żel aktywny Complex** pozostaje na skórze przez 24 godziny, następnie klient samodzielnie zmywa preparat według zaleceń higienizacyjnych

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Aktywator młodości, Aktywny płat kosmetyczny, Tarcza ochronna

Skóra z możliwością wykonania mikronakłuć (etap 2)

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na obszar zabiegowy nanosimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7-15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustą zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- wykonujemy mikronakłucie
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty nanosimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- **Żel aktywny Complex** pozostaje na skórze przez 24 godziny, następnie klient samodzielnie zmywa preparat według zaleceń higienizacyjnych

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Aktywator młodości, Aktywny płat kosmetyczny, Tarcza ochronna

ZABIEG BANKIETOWY

Skóra sucha, wrażliwa, teleangiektazje

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**

- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносимy **Aktywne enzymy (2 dozy)** jako maskę, a dodatkowo w celu okluzji przykrywamy obszar zabiegowy maską w płacie nasączoną **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10–20 minut
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносимy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na skórę nakładamy jako maskę w płacie **Aktywny płat kosmetyczny (1 szt.)** i pozostawiamy na 20 minut (nie zmywamy, a jedynie nadmiar osuszamy)
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywny regenerator kosmetyczny (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Aktywny koncentrat peptydowy, Aktywator młodości, Aktywny płat kosmetyczny, Tarcza ochronna

Skóra przetłuszczająca się, niedotleniona, z zaburzeniami pigmentacji

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- **Aktywne enzymy (2 dozy)** mieszamy z **Płynem melano STOP (1 doza)** i jako maskę aplikujemy na skórę do wchłonięcia na 10–20 minut
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносимy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na skórę nakładamy jako maskę w płacie **Aktywny płat kosmetyczny (1 szt.)** i pozostawiamy na 20 minut (nie zmywamy, a jedynie nadmiar osuszamy)

- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywator młodości (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Aktywator młodości, Płyn melano STOP, Aktywny płat kosmetyczny, Tarcza ochronna

Skóra bardzo gruba, oporna, z zaburzeniami pigmentacji

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na obszar zabiegowy наносимy **Żel kwasowy (2 dozy)**, wmasowujemy i pozostawiamy na skórze na 7-15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustką zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносимy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10-20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na skórę nakładamy jako maskę w płacie **Aktywny płat kosmetyczny (1 szt.)** i pozostawiamy na 20 minut (nie zmywamy, a jedynie nadmiar osuszamy)
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Aktywator młodości (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn oczyszczający, Płyn tonizujący, Żywa maska, Aktywny regenerator kosmetyczny, Aktywator młodości, Płyn melano STOP, Aktywny płat kosmetyczny, Tarcza ochronna

BLIZNY, ROZSTĘPY

----- POCZĄTEK TERAPII -----

Blizny białe, blade rozstępy

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**

- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie bezpośrednio na skórę aplikujemy **Płyn melano STOP (1 doza)** i wykonujemy masaż dłońmi, wmasowując preparat w skórę
- wykonujemy mikronakłucie
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- **Żel aktywny Complex** pozostaje na skórze przez 24 godziny, następnie klient samodzielnie zmywa preparat według zaleceń higienizacyjnych
- po upływie jednej doby, kiedy gospodarka hormonalna i enzymatyczna skóry skończy cykl dobowy, przez 3 kolejne dni klient stosuje dwa razy dziennie (rano i wieczorem) **Aktywny opatrunek kosmetyczny (1 doza)**; w przypadku innego obszaru niż twarz liczbę doz terapeuty zaleca indywidualnie
- następnie – do zakończenia terapii – na obszar blizny zalecane jest stosowanie minimum raz dziennie **Aktywnego opatrunku kosmetycznego (1 doza)**; w przypadku innego obszaru niż twarz liczbę doz terapeuty zaleca indywidualnie

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Aktywny opatrunek kosmetyczny, Żywa maska, Lipidowa odbudowa

Blizny pozapalne, czerwone rozstępny

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie bezpośrednio na skórę aplikujemy **Płyn melano STOP (1 doza)** i wykonujemy masaż dłońmi, wmasowując preparat w skórę
- wykonujemy mikronakłucie
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- **Żel aktywny** pozostaje na skórze przez 24 godziny, następnie klient samodzielnie zmywa preparat według zaleceń higienizacyjnych
- po upływie jednej doby, kiedy gospodarka hormonalna i enzymatyczna skóry skończy cykl dobowy, przez 3 kolejne dni klient stosuje dwa razy dziennie (rano i wieczorem) **Aktywny opatrunek kosmetyczny (1 doza)**; w przypadku innego obszaru niż twarz liczbę doz terapeuty zaleca indywidualnie

- następnie – do zakończenia terapii – na obszar blizny zalecane jest stosowanie minimum raz dziennie **Aktywnego opatrunku kosmetycznego (1 doza)**; w przypadku innego obszaru niż twarz liczbę doz terapeuta zaleca indywidualnie

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Aktywny opatrunek kosmetyczny, Żywa maska, Lipidowa odbudowa

----- DALSZE ETAPY TERAPII -----

Blizny białe, blade rozstępny

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie bezpośrednio na skórę aplikujemy **Płyn melano STOP (1 doza)** i wykonujemy masaż dłońmi, wmasowując preparat w skórę
- na obszar zabiegowy наносimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7-15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustą zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- wykonujemy mikronakłucie
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny Complex (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10-20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- **Żel aktywny Complex** pozostaje na skórze przez 24 godziny, następnie klient samodzielnie zmywa preparat według zaleceń higienizacyjnych
- po upływie jednej doby, kiedy gospodarka hormonalna i enzymatyczna skóry skończy cykl dobowy, przez 3 kolejne dni klient stosuje dwa razy dziennie (rano i wieczorem) **Aktywny opatrunek kosmetyczny (1 doza)**; w przypadku innego obszaru niż twarz liczbę doz terapeuta zaleca indywidualnie
- następnie – do zakończenia terapii – na obszar blizny zalecane jest stosowanie minimum raz dziennie **Aktywnego opatrunku kosmetycznego (1 doza)**; w przypadku innego obszaru niż twarz liczbę doz terapeuta zaleca indywidualnie

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Aktywny opatrunek kosmetyczny, Żywa maska, Lipidowa odbudowa

Blizny pozapalne, czerwone rozstępny

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**

- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie bezpośrednio na skórę aplikujemy **Płyn melano STOP (1 doza)** i wykonujemy masaż dłońmi, wmasowując preparat w skórę
- na obszar zabiegowy наносimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7–15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustką zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- wykonujemy mikronakłucie
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- **Żel aktywny** pozostaje na skórze przez 24 godziny, następnie klient samodzielnie zmywa preparat według zaleceń higienizacyjnych
- po upływie jednej doby, kiedy gospodarka hormonalna i enzymatyczna skóry skończy cykl dobowy, przez 3 kolejne dni klient stosuje dwa razy dziennie (rano i wieczorem) **Aktywny opatrunek kosmetyczny (1 doza)**; w przypadku innego obszaru niż twarz liczbę doz terapeuty zaleca indywidualnie
- następnie – do zakończenia terapii – na obszar blizny zalecane jest stosowanie minimum raz dziennie **Aktywnego opatrunku kosmetycznego (1 doza)**; w przypadku innego obszaru niż twarz liczbę doz terapeuty zaleca indywidualnie

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Aktywny opatrunek kosmetyczny, Żywa maska, Lipidowa odbudowa

AKTYWNA REDUKCJA PRZEBARWIEŃ I ANTYOKSYDACJA

----- POCZĄTEK TERAPII -----

Skóra z zaburzoną barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- наносimy **Aktywne enzymy (2 dozy)** jako maskę, a dodatkowo w celu okluzji przykrywamy obszar zabiegowy maską w płacie nasączoną **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i pozostawiamy na skórze 10–20 minut

- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie наносimy **Tarczę ANTY oksydant (2 dozy)** i pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Koncentrat melano STOP (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn melano STOP, Koncentrat melano STOP, Tarcza ANTY oksydant, Tarcza ochronna, Żywa maska, Aktywator młodości, Aktywny regenerator kosmetyczny

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- **Aktywne enzymy (2 dozy)** mieszamy z **Płynem melano STOP (1 doza)** i jako maskę aplikujemy na skórę do wchłonięcia na 10–20 minut
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie наносimy **Tarczę ANTY oksydant (2 dozy)** i pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10–20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Koncentrat melano STOP (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn melano STOP, Koncentrat melano STOP, Tarcza ANTY oksydant, Tarcza ochronna, Żywa maska, Aktywator młodości, Aktywny regenerator kosmetyczny

----- DALSZE ETAPY TERAPII -----

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową, odporna

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie bezpośrednio na skórę aplikujemy **Płyn melano STOP (1 doza)** i wykonujemy masaż dłońmi, wmasowując preparat w skórę
- na obszar zabiegowy наносimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7-15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustą zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie наносimy **Tarczę ANTY oksydant (2 dozy)** i pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносimy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10-20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Koncentrat melano STOP (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn melano STOP, Koncentrat melano STOP, Tarcza ANTY oksydant, Tarcza ochronna, Żywa maska, Aktywator młodości, Aktywny regenerator kosmetyczny

Skóra z prawidłową barierą hydrolipidową, odporna, z możliwością wykonania mikronakłucia

Po odpowiednim przygotowaniu klienta do zabiegu, uwzględniając przeciwwskazania, rozpoczynamy procedurę:

- skórę zmywamy dwukrotnie **Płynem oczyszczającym (2 dozy)**
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- następnie bezpośrednio na skórę aplikujemy **Płyn melano STOP (1 doza)** i wykonujemy masaż dłońmi, wmasowując preparat w skórę
- na obszar zabiegowy наносimy **Żel kwasowy (2 dozy)** na 7-15 minut, po upływie tego czasu wacikami obficie nasączamy skórę **Neutralizatorem kwasów** i zmywamy ją chustą zabiegową, czynność zmycia powtarzamy
- nasączamy wacik **Płynem aktywnym PLUS (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- wykonujemy mikronakłucie

- następnie наносимy **Tarczę ANTY oksydant (2 dozy)** i pozostawiamy do wchłonięcia
- obszar zabiegowy dzielimy na segmenty, tj. policzki, czoło, nos i broda, następnie kolejno na poszczególne segmenty наносимy **Żel aktywny (4 dozy)** za pomocą jednorazowej szpatułki lub bezpośrednio na skórę
- na obszarze zabiegowym pracujemy aparaturą 10-20 minut lub do wchłonięcia się preparatu (w niektórych przypadkach może wystąpić zaczerwienienie); w celu przedłużenia procedury możliwe jest użycie żelu do ultrasonografii (USG)
- nasączamy wacik **Płynem tonizującym (3 dozy)** i aplikujemy preparat, stemplując skórę, pozostawiamy do wchłonięcia
- na zakończenie zabiegu aplikujemy **Koncentrat melano STOP (1 doza)**, pozostawiamy do wchłonięcia, a następnie **Tarczę ochronną (1 doza)**

Rekomendowany zestaw do pielęgnacji domowej: Płyn melano STOP, Koncentrat melano STOP, Tarcza ANTY oksydant, Tarcza ochronna, Żywa maska, Aktywator młodości, Aktywny regenerator kosmetyczny

Więcej informacji na temat preparatów estGen:



estgen.pl



estGen | Świadoma Kosmetologia



estgen inżynieria tkankowa